



Stresschema hydrocortison behandeling bij kinderen met PWS

Mate van stress	Uw zoon/dochter kan medicijnen slikken	Uw zoon/dochter kan geen medicijnen slikken of niet binnenhouden
Lichte stress <ul style="list-style-type: none"> Niet lekker Hangerig Temperatuur onder 38 °C 	Geen extra medicijnen nodig	
Matige stress <ul style="list-style-type: none"> Ziek Infectie / griep Temperatuur tussen 38 °C en 39 °C Vaccinatie Verdoving (tandarts) 	Methode A: <i>Overweeg</i> hydrocortison volgens onderstaande schema Kinderen tot 16 jaar: 30 mg/m ² /dag in 4 giften per os.	Methode C is bedoeld voor de acute opvang. Steeds moet contact opgenomen worden met de behandelende (kinder)arts-endocrinoloog. Zodra mogelijk dient de medicatie in de vorm van tabletten weer voortgezet te worden. Methode C: Solu-Cortef voorgevulde spuiten van 100 mg/2 ml <ul style="list-style-type: none"> < 1 jaar: eenmalig 25 mg i.m. < 6 jaar: eenmalig 50 mg i.m. ≥ 6 jaar: eenmalig 100 mg i.m.
Ernstige stress <ul style="list-style-type: none"> Temperatuur boven 39 °C Braken, diarree Ernstig ziek Operatie, narcose Ongeval 	Methode B: Zie onderstaand schema. Kinderen tot 16 jaar: 60 mg/m ² /dag in 4 giften	

	Ochtend	Middag	Avond	Nacht	tabletsterkte
tijdstippen					
normale medicatie	mg	mg	mg	mg	1 – 2 – 5 – 10 – 20 mg
methode A	mg	mg	mg	mg	1 – 2 – 5 – 10 – 20 mg
methode B	mg	mg	mg	mg	1 – 2 – 5 – 10 – 20 mg
methode C	Solu-cortef 100mg/2 ml		25mg / 50 mg / 100mg		

Belangrijke telefoonnummers (in te vullen door arts): Tijdens kantooruren: _____ Buiten kantooruren: _____

BIJ OPERATIE/NARCOSE:

- Dit schema altijd meenemen, ook bij pre-operatieve afspraak, en tonen aan anesthesist
- Altijd de ochtend dosis hydrocortison innemen, ook bij nuchter blijven (neem met een klein slokje water)

VOOR ANAESTHESIST:

- Zo mogelijk eerste op de lijst
- Geef perioperatief intraveneus stressdosis glucocorticoïden



Stresschema hydrocortison behandeling bij volwassenen met PWS

Belangrijke telefoonnummers (in te vullen door arts):

Tijdens kantooruren: _____ Buiten kantooruren: _____

Gebruikelijk is om patiënten een noodampul solu-cortef 100 mg mee te geven voor i.m. gebruik.

Indien het noodzakelijk is geweest de noodampul te gebruiken dient men onmiddellijk contact op te nemen met de behandelend internist-endocrinoloog.

Oraal stress-schema

Matige stress: bijvoorbeeld urineweginfectie, kleine tandheelkundige ingreep:

10 - 5 - 5 mg

Hevige stress: grotere ingreep (in het zeldzame geval dat er geen infuus wordt gegeven):

20 - 10 - 10 mg.